~~[illegible]~~ Memoire N°: 57. polype uterin

Mad.me Martin agée de Soixante dix ans d'un Temperament Senguin á Toujours Joui d'assés d'ambonpoint et de fraicheur et d'une Santé ferme et constente elle etoit Seulement Sujette á des pertes blanches qui pendant cés dernieres années l'affoiblissoit un peu par leur abondance, Sans avoir d'ailleurs aucune mauvaise qualité depuis environ Six mois il paroit aussi de pertes rouges qui acompagnoit ou alternent avec les premieres, et qui deviennent pu á pu plus abondantes et plus continues. Lepuisement, de lacitudes un peu de paleur, la diminution de lapetit, et une douleur Sourde aux reins, en Sont les Simptomes concommitans, Sés — Simptomes ont cedé cependant en tout ou en trés grande partie á Lusage de quelques bouillons et autres remedes generaux.

en ce plaignant de cés pertes la malade ce plaignoit aussi d'un embarras dans le vagin. on Soupçonnoit d'aprés Son raport une Chute de matrice quelqu'autre deplacement ou quelqu'autre vice local, mais elle en á toujours — eludé Lexamen Jusquá ce moment, enfin on á — reconnu une excroissance, une espece de champignon formé d'une Substance glanduleuse, Scituée Sous larcade et entre les deux bors de Lospubis, distant d'un pouce, de L'oriffice de Luretre, ou meat urinaire, lors que Cést oriffice est tiraillé vers le haut pour mieux decouvrir le pedicule de la Tumeur. ce pedicule á huit lignes de diametre et á beaucoup de Sensibilité la malade en Souffre davantage lors quon la Touche du cotté du meat urinaire. la longueur de la Tumeur est de

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 18d 4 Dem n° 57

Trois pouces depuis son insertion ou sa base jusqu'à son bout exterieur; celui si á deux pouces de diametre et se presente au dehors entre les grandes levres. la surface de toute la tumeur est plus ou moins parsemée et erixée de grains glanduleux plus ou moins rouges, peu sensibles et sanguinaulents; cette surface est assés semblable par ces inegalités á celle d'une grenade ouverte ou á celle d'un chouxfleur;

Lestirpation par le fer Tranchan est elle le seul moyen de Curation qui paroitroit indiqué? en ce cas la sensibilité du pedicule doit elle laiser esperer une cicatrice assurée, et par quel topiques pourroit on plus facilement y parvenir? le cannal de Luretre qui passe à la base de la tumeur doit il inspirer quelque crainte quoi que dans ce moment il ne paraisse pas du tout affecté; enfin la degeneration qu'on entrevoit dans un Traitement palliatif doit elle inspirer des Craintes plus fondées? telles sont les questions que l'on soumet aux Lumieres et a la sagesse de Messieurs Lorüs./.